


Die fischzönotische Grundausprägung der sächsischen Fließgewässer OWK



Typ der fischzönotischen Grundausprägung

- | | |
|--|-----------------------------------|
| — Mono-Bachforellen-Gewässer | — Elritzen-Schmerlen-Gewässer III |
| — Bachforellen-Gropen-Gewässer I | — Gründling-Schmerlen-Gewässer I |
| — Bachforellen-Gropen-Gewässer II | — Gründling-Schmerlen-Gewässer II |
| — Bachforellen-Gropen-Gewässer III | — Gründling-Rotaugen-Gewässer I |
| — Bachforellen-Gropen-Schmerlen-Gewässer | — Gründling-Rotaugen-Gewässer II |
| — Bachforellen-Schmerlen-Gewässer I | — Barsch-Rotaugen-Gewässer |
| — Bachforellen-Schmerlen-Gewässer II | — Elbe |
| — Bachforellen-Schmerlen-Gewässer III | — Lausitzer Neiße |
| — Bachforellen-Schmerlen-Gewässer IV | — Gräben |
| — Äschen-Bachforellen-Gewässer | — Stillgewässer |
| — Elritzen-Schmerlen-Gewässer I | — Fließgewässer ohne Zuordnung |
| — Elritzen-Schmerlen-Gewässer II | |

Einzugsgebiete

- Eger (Ohre)
- Polzen (Ploucnice)
- Elbe
- Schwarze Elster
- Zwickauer Mulde
- Freiburger Mulde
- Vereinigte Mulde
- Saale
- Weiße Elster
- Spree
- Lausitzer Neiße

LANDESAMT FÜR UMWELT,
LANDWIRTSCHAFT
UND GEOLOGIE



Freistaat
SACHSEN

Bearbeitung: Referat 76 - Fischerei
 Bearbeitungsstand: 2024
 Geobasisdaten: GeoSN
 Maßstab: 1: 650.000

